

Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Recursos Naturais



ENGENHARIA HÍDRICA

**Balanço Hídrico Climatológico para Itajubá-MG:
Cenário Atual e Projeções Climáticas**

Alexandre Magalhães de Moraes Ramos Alves

Itajubá - MG
Outubro / 2019

Balanço Hídrico Climatológico para Itajubá-MG: Cenário Atual e Projeções Climáticas

Alexandre Magalhães de Moraes Ramos Alves

Monografia submetida à banca examinadora do Trabalho Final de Graduação apresentado à Universidade Federal de Itajubá, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Engenheiro Hídrico.

Orientadora: Prof.^a. Dr.^a. Fabrina Bolzan Martins.

Coorientadora: Prof.^a. Dr.^a. Michelle Simões Reboita.

Itajubá - MG
Outubro / 2019



Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Instituto de Recursos Naturais
Engenharia Hídrica

FOLHA DE APROVAÇÃO

O Trabalho Final de Graduação do curso de Engenharia Hídrica do aluno ALEXANDRE MAGALHÃES DE MORAIS RAMOS ALVES intitulado **"BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO PARA ITAJUBÁ-MG: CENÁRIO ATUAL E PROJEÇÕES CLIMÁTICAS"** foi APROVADO.

Itajubá, 31 de outubro de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. FABRINA BOLZAN MARTINS

Presidente / Orientador(a)

Profa. Dra. MICHELLE SIMÕES REBOITA

Prof. Dr. BENEDITO CLÁUDIO DA SILVA

Bel. Met. ANA FLÁVIA MARTINS MONTEIRO

Dedico este trabalho final de graduação ao curso de Engenharia Hídrica da Unifei, e às pessoas com quem convivi nesse espaço ao longo desses anos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus por permitir que tudo isso acontecesse nesses meus anos como universitário, dando-me força para superar todas as dificuldades que encontrei.

Agradeço também à Universidade Federal de Itajubá pelo ambiente criativo e amigável que me proporcionou, e ao curso de Engenharia Hídrica pelo aprendizado e aprimoramento profissional.

À minha professora, orientadora e amiga, Fabrina Bolzan Martins, pelo apoio, confiança e paciência nesses anos de graduação, tanto na elaboração desse trabalho quanto nos dois projetos de iniciação científica nos quais me orientou. Obrigado por seus ensinamentos que com certeza vou levar para a vida pessoal e profissional, ensinamentos esses que foram essenciais e complementaram minha vivência acadêmica.

Da mesma forma agradeço a minha coorientadora Michelle Simões Reboita, pelo apoio, esclarecimentos e tempo dedicado à confecção deste trabalho final de graduação.

Aos meus amigos, André, Gilberto, Gerardo, Matheus e Michael por todo apoio nesses cinco anos, projetos em grupo, risadas, companheirismo e pelas amizades que levarei pro resto da vida. A todos vocês queridos amigos que irão fazer falta, obrigado por me darem força, segurança para pedir ajuda a qualquer hora e por serem uma segunda família.

Agradeço também aos professores do curso de Engenharia Hídrica por todo o conhecimento transmitido e experiências compartilhadas.

Por fim, agradeço a minha família pelo apoio e confiança nessa jornada, e a minha querida namorada Maria Caroline por ser minha companheira e suporte durante todos esses anos, além de me ajudar a superar todas as dificuldades.

A todos que contribuíram de forma direta ou indireta para a realização desse trabalho, deixo minha profunda gratidão.

“Quando o poço secar, saberemos o verdadeiro valor da água.”

Benjamin Franklin

RESUMO

Projeções climáticas ao longo do século XXI têm indicado aumento da temperatura do ar, e irregularidades na precipitação no Estado de Minas Gerais (MG), os quais afetarão a evapotranspiração e, conseqüentemente, o balanço hídrico. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi verificar o impacto das mudanças climáticas no balanço hídrico climatológico (BHC) no município de Itajubá no período de 2021 a 2099 considerando o cenário de emissão com caminho representativo de concentração (RCP) de 8.5 do *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Para o estudo foram utilizadas projeções do modelo climático regional RegCM4 dirigido pelas saídas do modelo global HadGEM2-ES. O BHC foi calculado para o clima presente (1979 – 2005), futuro próximo (2021 – 2049) e futuro distante (2071 – 2099), considerando o método de Thornthwaite e Mather (1957) simplificado, em que apenas se necessita da climatologia da temperatura média do ar e precipitação. Projeta-se, no final do século XXI, um aumento de aproximadamente 5°C na temperatura média do ar para Itajubá, além de um padrão heterogêneo de precipitação, com projeções de aumento nos meses de primavera e verão e redução nos meses de outono e inverno. Para o BHC é projetado aumento gradual na evapotranspiração real, chegando a 86 mm mês⁻¹ nos meses de verão, e alteração na deficiência (DEF) e excedente hídrico (EXC). De maneira geral, é projetado um aumento da DEF e EXC nos meses de outono/inverno e verão, respectivamente. Tais alterações não são benéficas, pois indicam aumento dos eventos extremos, aumento da água nociva e queda de produtividade para as principais culturas de Itajubá, como o milho, a batata, o feijão e o café.

Palavras-chave: Disponibilidade Hídrica; Evapotranspiração; Climatologia.

ABSTRACT

Climate projections throughout the 21st century have shown notable rise in the air temperature and irregularities in the rain regime in the state of Minas Gerais (MG), which will affect the evapotranspiration pattern and hence the water balance. Thus, the main goal of this research was to acknowledge the impact of climate change on the climatological water balance (CWB) in Itajubá county, from 2021 to 2099, considering the representative concentration pathways (RCP) 8.5 emission scenario of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). For the study it was used projections of the regional climate model RegCM4 driven by the outputs of the HadGEM2-ES global model. The CWB was calculated for the present (1979 - 2005), near future (2021 - 2049) and distant future (2071 - 2099) climate, considering the simplified Thornthwaite and Mather method (1957), where only the average air temperature and precipitation regime is required. It is projected, by the end of the 21st century, an increase of approximately 5°C in the average air temperature for Itajubá, in addition to a heterogeneous precipitation pattern, with projections of increase in the spring and summer months and reduction in the fall and winter months. For the CWB, a gradual increase in actual evapotranspiration is projected, reaching 86 mm month⁻¹ in the summer months, and changes in deficiency (DEF) and water surplus (EXC). In general, an increase in DEF is projected in the fall/winter months and an increase in EXC is projected in the summer months. Such changes are not beneficial as they indicate increased occurrence of extreme events, increased poor quality water and yield decrease for Itajubá's main crops, such as corn, potatoes, beans and coffee.

Keywords: Water Availability; Evapotranspiration; Climatology.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Representação da evapotranspiração.....	16
Figura 2: Representação do balanço hídrico climatológico simplificado.....	17
Figura 3: Ciclo anual de temperatura média do ar (A) e precipitação acumulada mensal (B) provenientes dos dados do Climate Prediction Center (CPC) e simulados pelo modelo regional de previsão climática RegCM4 para o período de 1979-2005 para Itajubá (MG).....	24
Figura 4: Variação temporal simulada (1979-2005) e projetada (2021 – 2099) e padrão mensal da temperatura média do ar (A,B), precipitação acumulada anual/mensal (C,D), evapotranspiração acumulada anual/mensal (E,F) para Itajubá considerando o período atual (1979 – 2005), futuro próximo (2021-2049) e futuro distante (2071-2099) obtidas pelo modelo regional RegCM4 e cenário forçante 8.5. Devido aos valores, os eixos das variáveis estão em escalas diferentes.....	25
Figura 5: Variação temporal simulada (1979-2005) e projetada (2021 – 2099) para a evapotranspiração real anual (A), excedente hídrico anual (C) e deficiência hídrica anual (E) para o cenário forçante RCP 8.5; e padrão mensal da evapotranspiração real acumulada (B), excedente hídrico (D) e deficiência hídrica (F) para Itajubá (MG), considerando o período atual (1979 – 2005), futuro próximo (2021-2049) e futuro distante (2071-2099) para o cenário forçante 8.5. Devido aos valores, os eixos das variáveis estão em escalas diferentes.....	27

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Avaliação da simulação dos dados de temperatura média do ar e precipitação acumulada mensal entre o modelo regional RegCM4 e os dados do <i>Climate Prediction Center</i> (CPC) (1979-2005).....	23
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

ARM – Armazenamento;

BHC – Balanço Hídrico Climatológico;

CAD - Capacidade de água disponível;

CORDEX - Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment;

CPC - Climate Prediction Center;

DEF- Déficit Hídrico;

ETP – Evapotranspiração Potencial;

ETR- Evapotranspiração Real;

EXC- Excedente hídrico;

FD – Futuro Distante;

FP – Futuro Próximo;

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change;

NEGACUM - Negativo Acumulado;

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration;

P – Precipitação;

PP – Período Presente;

RCP – Representative Concentration Pathways;

T – Temperatura do Ar.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	12
2. OBJETIVOS	14
2.1. Objetivo Principal	14
2.2. Objetivos Secundários	14
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	15
3.1. Modelos de Projeções Climáticas	15
3.2. Evapotranspiração	16
3.3. Balanço Hídrico Climatológico.	17
3.4. Mudanças Climáticas	18
4. MATERIAL E MÉTODOS	19
4.1. Dados e local de estudo	19
4.2. Obtenção da climatologia e evapotranspiração potencial	20
4.3. Balanço Hídrico Climatológico	21
4.4. Análise do impacto das mudanças climáticas	22
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO	23
5.1. Clima Presente	23
5.2. Clima Futuro	24
6. CONCLUSÃO	33
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34

1. INTRODUÇÃO

Muitos sistemas naturais estão sendo afetados pelas mudanças climáticas regionais (RESENDE et al., 2019) e o impacto dessas mudanças será maior no setor agrícola e nos países em que a agricultura é a atividade econômica primária (PORFIRIO et al., 2018), como o Brasil (TAVARES et al., 2018; RESENDE et al., 2019). Nesse contexto, a região sudeste, especialmente o Estado de Minas Gerais (MG), é considerado um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas (DARELA-FILHO et al., 2016; NATIVIDADE et al., 2017; SANTOS et al., 2017; TAVARES et al., 2018) devido ao grande contingente populacional (21.040.662 habitantes IBGE, 2019) e à taxa de pobreza, principalmente na região norte do estado (3,01% taxa de pobreza extrema IPEA, 2012).

Estudos sobre mudanças climáticas e o impacto na disponibilidade hídrica podem ser realizados com saídas de modelos climáticos regionais e globais, sendo que os regionais possuem capacidade de representar as circulações de mesoescala, tais como as brisas, o que não ocorre com os modelos climáticos globais, cuja resolução horizontal é mais grosseira. Portanto, os modelos regionais podem representar melhor o clima de uma dada região (AMBRIZZI et al., 2018). Estudos de projeções climáticas realizados para Minas Gerais utilizando saídas de ambos os modelos apontam alterações nos campos médios sazonais de precipitação e temperatura do ar (SANTOS et al., 2017; MARTINS et al., 2018; REBOITA et al., 2018b; TAVARES et al., 2018). Especificamente, no decorrer do século XXI são projetados aumentos na temperatura do ar, chegando a 5°C, e padrões heterogêneos de mudanças na precipitação (SANTOS et al., 2017). Tais alterações afetarão conjuntamente a quantidade de água disponível no solo (MARTINS et al., 2019), os padrões de evapotranspiração e do balanço hídrico (ASSAD et al., 2004; TANASIJEVIC et al., 2014; MARTINS et al., 2018; SLAMA et al., 2019; RESENDE et al., 2019), que por sua vez irá prejudicar a sustentabilidade dos sistemas agrícolas, as áreas de aptidão aos cultivos (ASSAD et al., 2004; SANTOS et al., 2017) e, conseqüentemente, a população dependente do setor agrícola será vulnerável (PORFIRIO et al., 2018; MARTINS et al., 2019).

O município de Itajubá, localizado na região sul de Minas Gerais, é uma região vulnerável em termos de condições orográficas e hidrológicas, sendo afetado por enchentes e inundações que causam consequências negativas para a população que vive,

principalmente, às margens do Rio Sapucaí e seus afluentes (BARBOSA et al., 2015). Além disso, o clima típico de monção com estação chuvosa entre outubro e março e seca nos demais meses do ano (SILVA E REBOITA, 2013), é mais vulnerável aos eventos naturais principalmente durante a estação chuvosa. No entanto, o clima do município favorece uma drenagem urbana deficitária em todos os meses do ano, sendo que na estação chuvosa há inundações e produção de água nociva quando comparado à produção de água útil, enquanto que nos meses de seca há diminuição do volume de recarga d'água dos rios, tendo como resultado a redução da disponibilidade hídrica no período de estiagem.

Com a redução da disponibilidade de água em Itajubá, dada pela falta de água de recarga, produção de água nociva ou pela irregularidade de chuvas, o setor agrícola será um dos mais afetados, uma vez que é altamente dependente da demanda hídrica para a produção de batata (235 t ano^{-1}), milho (209 t ano^{-1}), tomate (200 t ano^{-1}), café (35 t ano^{-1}) e feijão (8 t ano^{-1}) (SIDRA, 2019). Estudos que avaliem o impacto das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica em municípios são escassos, principalmente os que utilizam modelos climáticos regionais. Além disso, não existem estudos dessa natureza em Itajubá o que constitui o principal objetivo desse estudo.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Principal

Verificar o impacto das mudanças climáticas no balanço hídrico climatológico para o município de Itajubá baseado nas condições de clima presente (PP) (1979 – 2005), futuro próximo (FP) (2021 - 2049) e futuro distante (FD) (2071 - 2099) através de projeções climáticas oriundas do modelo regional RegCM4 (com 50 km de resolução horizontal), dirigido pelas saídas do modelo global HadGEM2-ES, considerando o cenário de emissão denominado *Representative Concentration Pathways* (RCP 8.5), que corresponde ao cenário com forçante radiativa mais intensa.

2.2. Objetivos Secundários

- Avaliar os padrões climáticos das variáveis temperatura do ar e da precipitação para o clima presente e clima futuro, assim como obter as normais climatológicas provisórias para cada período (PP, FP e FD).
- Calcular e avaliar a variabilidade da evapotranspiração para o clima presente (1979-2005), futuro próximo (2021-2049) e futuro distante (2071-2099) para Itajubá - MG.
- Obter o balanço hídrico climatológico e os respectivos extratos (deficiência, excedente e evapotranspiração real) para o clima presente, FP e FD.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. Modelos de Projeções Climáticas

A previsão climática, diferentemente da previsão do tempo, indica as variações sazonais do clima de uma certa localidade, projetada para uma escala de tempo futura. Essa previsão pode ser realizada com um modelo de circulação geral da atmosfera ou com modelo de área limitada, conhecidos como modelo global e modelo regional, respectivamente (REBOITA et al., 2018a).

Segundo Ambrizzi et al. (2018), os modelos globais não conseguem levar em consideração detalhes como a topografia do terreno, áreas urbanas, entre outros, devido a sua baixa resolução, trazendo resultados menos precisos em locais com grande quantidade de detalhes que influenciam no clima. Por outro lado, os modelos regionais, devido a sua área reduzida de atuação, conseguem atingir uma maior resolução, trazendo resultados mais realistas na previsão de variáveis climatológicas.

De modo a retratar com maior precisão as variações climáticas, os modelos regionais mais atuais (RegCM) utilizam não somente os dados de sua área limitada de atuação, mas também dados da circulação atmosférica global através do seu aninhamento à modelos globais (AMBRIZZI et al., 2018).

Deste modo, se mostrou viável a obtenção dos dados futuros de precipitação e temperatura para a cidade de Itajubá – MG, pelo modelo climático regional RegCM4 aninhado ao modelo HadGEM2 – ES, que recebe o nome de RegHad.

O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2013) enfatiza a necessidade de se prever as variações climáticas a fim de se ter informações consistentes para tomadores de decisão. No Brasil, a agricultura, geração de energia hidroelétrica e turismo são algumas das atividades econômicas diretamente influenciadas pelo clima. Assim, previsões climáticas de boa qualidade se tornam de grande importância para o sucesso dessas atividades (REBOITA et al., 2018a).

3.2. Evapotranspiração

O termo evapotranspiração é um modo simplificado, proposto por Thornthwaite e Wilm (1944), de explicar os processos conjuntos de evaporação e transpiração, que podem se mesclar em apenas uma variável no estudo do solo, pois ambos representam a saída de água do solo.

Segundo Pereira et al. (2007), pode-se definir evapotranspiração como o processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera por evaporação da água do solo e por transpiração das plantas (Figura 1).

Dependendo do tipo de solo, vegetação, tamanho da área analisada e da disponibilidade hídrica, divide-se a evapotranspiração em algumas classes como potencial, real, de oásis, e de cultura.

Nessa pesquisa será utilizada apenas a evapotranspiração potencial (ETP), definida como a quantidade de água que seria utilizada por uma extensa superfície vegetada com grama, com altura entre 8 e 15 cm, em crescimento ativo, cobrindo totalmente a superfície do solo, e sem restrição hídrica (PEREIRA et al, 2007); tomando como referência a escala mensal.

Devido a inexistência de dados medidos, justificou-se a utilização de métodos para sua estimativa. Dos métodos existentes, o de Thornthwaite se mostra como um dos mais simples, já que usa como variável de entrada apenas a temperatura média do ar, sendo o mesmo um dos primeiros métodos desenvolvidos exclusivamente para se estimar a evapotranspiração potencial mensal (THORNTHWAITE, 1948).




Figura 1: Representação da evapotranspiração.

Fonte: IP – Sustentabilidade, 2019.

3.3. Balanço Hídrico Climatológico.

Segundo Pereira et al. (2007), o balanço hídrico climatológico (BHC) pode ser definido como a contabilização da água do solo, aplicando o princípio de conservação de massa de água num volume vegetado de solo. Isso significa aplicar matematicamente um balanço das entradas e saídas de água do volume de controle estudado. Essas entradas e saídas podem ocorrer de várias maneiras, porém para uma região úmida, com chuvas regulares, para efeito de simplificação, pode-se considerar relevantes apenas a precipitação (entrada de água) e a evapotranspiração (saída de água).

O armazenamento de água no solo é simplesmente a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração, como visualizado na Figura 2.




Figura 2: Representação do balanço hídrico climatológico simplificado.

Fonte: Meteorologia Agrícola - Pereira et.al., 2007.

O balanço hídrico climatológico (BHC) mais utilizado é o balanço hídrico climatológico normal (cíclico), que apresenta escala mensal. Esse tipo de balanço hídrico climatológico é uma das ferramentas mais usadas para a estimativa da deficiência e do excedente hídrico, da reposição e da retirada da água do solo e da quantidade de água armazenada no mesmo (CARVALHO et al., 2011).

Segundo Santos et al. (2017), a alteração nos padrões climáticos atuais, decorrentes de mudanças climáticas, podem impactar ou até mesmo inviabilizar o cultivo de determinadas culturas, devido as modificações nos padrões de evapotranspiração e precipitação, alterando assim o extrato do balanço hídrico, assim como, acarretar mudanças nas respostas fenológicas e duração dos estágios de desenvolvimento das culturas.

3.4. Mudanças Climáticas

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), em seu quinto relatório de avaliação, utilizando observações desde o século XX, evidenciou variações significativas nos parâmetros climáticos por todo o globo (IPCC, 2013). Segundo o IPCC (2013), a ocorrência dessas variações dos parâmetros com significância estatística, que se mantêm ao longo do tempo (acima de várias décadas), caracterizam mudanças climáticas. Apesar do clima apresentar uma variabilidade natural, nas últimas décadas vários fenômenos e eventos atmosféricos estão acontecendo em uma frequência e magnitude jamais observados no passado, evidenciando as mudanças climáticas (IPCC, 2013; SANTOS et al., 2017).

No Brasil, as projeções de mudanças climáticas para o final do século XXI indicam aumento mínimo de 3 °C na temperatura, em todo o território nacional, sendo que a região Amazônica apresenta as maiores mudanças, com aumento projetado de até 5 °C ou mais (IPCC, 2013; TORRES, 2014). Já as projeções de mudança na precipitação indicam tendências heterogêneas, com aumento da precipitação em algumas áreas e redução em outras (WOLDEMESKEL et al., 2016; SANTOS et al., 2017).

Esses prognósticos indicam que grande parte do Brasil será afetado pelas mudanças climáticas (TORRES et al., 2012) principalmente as regiões no qual suas economias são altamente associadas ao agronegócio (CERA, 2015), como é o caso das regiões Sul e Sudeste. Isso ocorre, uma vez que modificações nos padrões climáticos alteram drasticamente as áreas aptas ao cultivo de determinadas culturas (ASSAD et al., 2013).

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Dados e local de estudo

Foram utilizados dados diários de temperatura média do ar (T_x ; °C) e precipitação acumulada (P ; mm dia⁻¹) no clima presente (PP, 1979 – 2005) e futuro, denominado futuro próximo (FP, 2021 – 2049) e futuro distante (FD, 2071 – 2099), considerando o cenário RCP8.5¹ (MOSS et al., 2010) do IPCC, para o município de Itajubá (22° 25' 32'' S; 45° 27' 10'' O), Minas Gerais. As projeções foram oriundas do modelo climático regional RegCM4 que foi executado na fase 1 do *Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment* (CORDEX: <http://cordex.org>) com 50 km de espaçamento de grade (GIORGI et al., 2009). O RegCM foi dirigido pelas projeções do modelo global HadGEM2–ES. O estudo utilizou dados do modelo regional devido à melhor resolução horizontal quando comparado ao global, e parametrizações físicas mais adequadas para resolução de processos atmosféricos de mesoescala, possibilitando uma melhor representação do clima local (CUADRA; ROCHA, 2006; LLOPART et al., 2017; REBOITA et al., 2018). Apenas o cenário baseado no RCP 8.5 foi utilizado, pois representa a forçante radiativa mais intensa (SANTOS et al., 2017; TAVARES et al., 2018).

Inicialmente, o período histórico das projeções (PP, 1979-2005) foi validado através de comparação com os dados do *Climate Prediction Center* (CPC: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov>) – *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) extraídos para o ponto de grade mais próximo de Itajubá (22.25° S, 45.75° O). Não foram utilizados dados de estação meteorológica na validação, uma vez que Itajubá não possuiu estações meteorológicas operantes entre 1979-2005. Os dados do CPC são construídos com base numa junção de dados observados de estações meteorológicas e de satélite (CHEN et al., 2008) e são atualizados diariamente (REBOITA et al., 2018).

¹ RCP8.5 = corresponde a uma forçante radiativa aproximada no final do século XXI de 8.5 W m⁻² e concentrações de CO₂ equivalente de 1370 partes por milhão, relativo às condições pré-industriais, e condiz com os maiores aumentos de temperatura por todo o globo (MOSS et al., 2010).

4.2. Obtenção da climatologia e evapotranspiração potencial

Primeiramente obtiveram-se as médias mensais climatológicas da temperatura média do ar e precipitação acumulada no clima presente (PP) e futuro (FP e FD) seguindo as recomendações da Organização Meteorológica Mundial (WMO, 1989) estabelecidas no documento técnico OMM/TD-Nº 341:

$$\bar{T}_{med} = \frac{\sum_{i=1}^n T_x}{n} \quad (1)$$

$$\bar{P}_{med} = \frac{\sum_{i=1}^n P_x}{n} \quad (2)$$

em que: $\bar{T}_{med}$ é a média climatológica da temperatura média do ar do *i-ésimo* mês (°C), T_x é a temperatura média diária do ar (°C); $\bar{P}_{med}$ é a média climatológica da precipitação mensal acumulada (mm mês⁻¹) e P_x é a precipitação acumulada do *i-ésimo* mês (mm mês⁻¹).

Para o cálculo da evapotranspiração potencial (ETP) foi utilizado o método proposto por Thornthwaite (1948) devido a inexistência de dados observados e disponíveis para o local de estudo e por apresentar bons resultados para a região sul de Minas Gerais (SANTOS et al., 2017). Além disso, é o método de estimativa de ETP mais utilizado para balanços hídricos climatológicos (SENTELHAS et al., 2008), uma vez que fornece diretamente os valores climatológicos mensais da ETP.

$$ETP_x = 16 \cdot \left(10 \cdot \frac{\bar{T}_{med}}{I}\right)^a \text{ quando } 0 \leq \bar{T}_{med} \leq 26,5 \quad (3)$$

$$ETP_x = -415,85 + 32,24 \cdot T_{med} - 0,43 \cdot \bar{T}_{med}^2 \text{ quando } \bar{T}_{med} > 26,5 \quad (4)$$

$$I = \sum_{n=1}^{12} (0,2 \cdot \bar{T}_{med})^{1,514} \quad (5)$$

$$a = 6,75 \cdot 10^{-7} \cdot I^3 - 7,71 \cdot 10^{-5} \cdot I^2 + 1,7912 \cdot 10^{-2} \cdot I + 0,49239 \quad (6)$$

$$N = \frac{2}{15} \cdot \arccos[-1 \cdot (\operatorname{tg} \varphi \cdot \operatorname{tg} \delta)] \quad (7)$$

$$C_i = \frac{N}{12} \cdot \frac{NDP_i}{30} \quad (8)$$

$$ETP = ETP_x \cdot C_i \quad (9)$$

em que: ETP_x é a evapotranspiração potencial não corrigida para o *i-ésimo* mês considerado ($i = 1$ à 12) (mm mês⁻¹); ETP é a evapotranspiração potencial corrigida para o *i-ésimo* mês considerado (mm mês⁻¹); $\bar{T}_{med}$ é a temperatura média normal do ar do *i-ésimo* mês ; I é o índice anual de calor; a é um índice térmico regional; C_i é o fator de correção; NDP_i é o número de dias do *i-ésimo* mês; N_i é o fotoperíodo do 15º dia do *i-*

ésimo mês, considerado representativo da média mensal; φ é a latitude e δ_i é a declinação solar do 15º dia do *i-ésimo* mês, os quais foram obtidos para Itajubá.

4.3. Balanço Hídrico Climatológico

Para o cômputo do balanço hídrico climatológico (BHC) foi utilizado o método proposto por Thornthwaite e Mather (1955, 1957) e simplificado por Pereira (2005), o qual fornece a quantidade de água armazenada no solo, evapotranspiração real (ETR), deficiência (DEF) e excedente hídrico (EXC) em nível local (SENTELHAS et al., 2008; SANTOS et al., 2017). Este método requer como dado de entrada as médias climatológicas mensais de precipitação acumulada ($\bar{P}_{med}$) e evapotranspiração potencial mensal ($\overline{ETP}$) obtida pelo método de Thornthwaite (1948), além do valor da capacidade de água disponível (CAD, mm). Por brevidade, adotou-se a CAD = 100 mm, por ser o valor recomendado em estudos climatológicos (SENTELHAS et al., 2008; MARTINS et al., 2018).

Primeiramente faz-se necessário definir o mês (i) de inicialização do balanço hídrico. Neste sentido, duas situações podem ocorrer: Situação I - valores anuais de $\sum(\bar{P}_{med} - \overline{ETP}) \geq 0$ ou $\sum(\bar{P}_{med} - \overline{ETP})^+ \geq CAD$, e Situação II: valores anuais de $\sum(\bar{P}_{med} - \overline{ETP}) < 0$ ou $\sum(\bar{P}_{med} - \overline{ETP})^+ < CAD$. Dependendo da situação foi adotado o critério de inicialização proposto em Pereira (2005). A partir de então, calcula-se simultaneamente o negativo acumulado (NEGACUM) e o armazenamento (ARM), através das expressões (PEREIRA, 2005):

Para a situação I:

$$NEGACUM_i = \bar{P}_{med_i} - \overline{ETP}_i \quad (10)$$

$$ARM_i = CAD \cdot e^{\left(\frac{NEGACUM_i}{CAD}\right)} \quad (11)$$

Se $\bar{P}_{med} - \overline{ETP}$ do mês $i+1 < 0$, calcula-se o $NEGACUM_{i+1}$ (Equação 12) e para o cálculo do ARM_{i+1} utiliza-se a equação 11.

$$NEGACUM_i = NEGACUM_{i-1} + (\bar{P}_{med_i} - \overline{ETP}_i) \quad (12)$$

Para os meses subsequentes (i+2, i+3, ..., i+n) em que $\bar{P}_{med_{i+n}} - \overline{ETP}_{i+n} < 0$, o mesmo procedimento é realizado (igual ao seguido para i+1). Em caso de alterar os valores mensais de $\bar{P}_{med} - \overline{ETP} (\geq 0)$, deve-se calcular primeiramente o ARM (equação 13) e posteriormente o NEGACUM (equação 14):

$$ARM_i = ARM_{i-1} + (\bar{P}_{med_i} - \overline{ETP}_i) \quad (13)$$

$$NEGACUM_i = CAD \cdot \ln\left(\frac{ARM_i}{CAD}\right) \quad (14)$$

Quando ARM for superior ao valor da CAD, assume-se que ARM = CAD e que o restante se refere aos valores de EXC.

Para a situação II:

Altera-se exclusivamente a equação utilizada para o mês de inicialização do balanço hídrico, da 10 para a equação 15 (PEREIRA, 2005):

$$NEGACUM_i = CAD \cdot \left[\ln\left(\frac{M}{CAD}\right) - \ln\left(1 - e^{\frac{N}{CAD}}\right) \right] \quad (15)$$

em que: M é o acumulado de $\bar{P}_{med} - \overline{ETP}$ da estação chuvosa (valores positivos de $\bar{P}_{med} - \overline{ETP} > 0$) e N é o acumulado de $\bar{P}_{med} - \overline{ETP}$ da estação seca (valores negativos de $\bar{P}_{med} - \overline{ETP} < 0$).

Posteriormente, foram obtidos os valores de ETR (equações 16 e 17), DEF (equações 18 e 19) e EXC (equação 20), através de:

$$ETR_i = \overline{ETP}, \text{ quando } (\bar{P}_{med} - \overline{ETP})_i \geq 0; \quad (16)$$

$$ETR_i = \bar{P}_{med_i} + |ARM_i - ARM_{i-1}|, \text{ quando } (\bar{P}_{med} - \overline{ETP})_i < 0. \quad (17)$$

No cálculo do EXC, o qual se refere à quantidade de água excedente do período chuvoso e se perde do volume de controle por percolação (drenagem profunda) e/ou escoamento superficial, considerou-se duas situações:

$$EXC_i = 0, \text{ quando } ARM_i < CAD; \quad (18)$$

$$EXC_i = (\bar{P}_{med} - \overline{ETP})_i - (ARM_i - ARM_{i-1}), \text{ quando } ARM = CAD. \quad (19)$$

A determinação da DEF foi calculada apenas quando $(\bar{P}_{med} - \overline{ETP})_i < 0$, caso contrário a DEF é nula:

$$DEF_i = \overline{ETP}_i - ETR_i, \text{ quando } (\bar{P}_{med} - \overline{ETP})_i < 0. \quad (20)$$

Após as etapas de cálculo foi realizada as aferições do balanço hídrico, conforme recomendações de Pereira (2005).

4.4. Análise do impacto das mudanças climáticas

Para verificar o impacto das mudanças climáticas no balanço hídrico climatológico (BHC) para Itajubá, calculou-se a ETP e o BHC com os valores médios das variáveis climáticas ($\bar{T}_{med}$ e $\bar{P}_{med}$) simuladas para o PP (1979-2005) e projetadas para o FP (2021-2049) e FD (2071-2099). Por fim, analisaram-se as projeções de mudança das variáveis do extrato do balanço hídrico climatológico anual (ETP, DEF, EXC), considerando o RCP 8.5, através do comparativo com o PP.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Clima Presente

Pela comparação entre os dados simulados pelo RegCM4 e os dados da análise do CPC, ambos para o PP (1979-2005), percebe-se pequeno viés ($<1,6^{\circ}\text{C}$), boa concordância, boa representação do ciclo anual da $\bar{T}_{med}$, pela proximidade do ciclo anual dos valores do RegCM4 e CPC; e maior viés para a $\bar{P}_{med}$ ($<103 \text{ mm mês}^{-1}$) (Tabela 1 e Figura 3).

Tabela 1: Avaliação da simulação dos dados de temperatura média do ar e precipitação acumulada mensal entre o modelo regional RegCM4 e os dados do *Climate Prediction Center* (CPC) (1979-2005).

Meses do ano	Temperatura média do ar ($^{\circ}\text{C}$)		Precipitação acumulada (mm mês^{-1})	
	RQME*	Viés Médio (VM)**	RQME*	Viés Médio (VM)**
Janeiro	1,8	~ 0	158,3	-103,7
Fevereiro	1,6	-0,3	123,4	-50,4
Março	2,3	-1,6	91,5	-37,3
Abril	1,8	-0,5	45,9	-12,9
Maio	1,9	0,2	51,2	-21,5
Junho	1,3	-0,1	69,8	34,6
Julho	1,9	-0,5	61,9	37,3
Agosto	2,3	-1,1	92,4	55,5
Setembro	2,6	-1,5	98,1	36,8
Outubro	1,9	-0,7	78,1	17,3
Novembro	2,3	-0,2	108,6	9,0
Dezembro	2,2	-1,2	137,4	-42,8

*RQME = raiz do quadrado médio do erro, dado por: $\text{RQME} = [\sum_{i=1}^n (E_i - O_i)^2 / N]^{0,5}$ ** VM = Viés médio, dado por: $\text{VM} = N^{-1} \sum_{i=1}^n (E_i - O_i)$ (MARTINS et al., 2014). Em que E_i = valores de T_{med} e P_{med} simulado pelo modelo RegCM4 para o PP (1979-2005); O_i = valores de T_{med} e P_{med} referente aos dados observados do CPC para o PP (1979-2005), N = número de observações.




Figura 3: Ciclo anual de temperatura média do ar (A) e precipitação acumulada mensal (B) provenientes dos dados do *Climate Prediction Center* (CPC) e simulados pelo modelo regional de previsão climática RegCM4 para o período de 1979-2005 para Itajubá (MG). Em cinza, dados do modelo RegCM4, em preto, dados do CPC.

Apesar de existir maior proximidade e melhor representatividade do ciclo anual para a $\bar{T}_{med}$ e maior variabilidade para a $\bar{P}_{med}$, principalmente para o mês de janeiro, o RegCM4 consegue reproduzir o comportamento mensal de ambas variáveis, semelhante ao observado por Reboita et al. (2018b). No caso da $\bar{T}_{med}$, as simulações do modelo foram ligeiramente mais frias que o dado do CPC, principalmente para os meses de março (VM = -1,6°C) e setembro (VM = -1,5°C) (Figura 3A). Já no caso da $\bar{P}_{med}$, apesar do RegCM4 ser hábil em representar o ciclo anual, apresenta diferenças nos valores mensais: subestimativa do modelo para os meses de verão (DJF, com VM = -65,6 mm mês⁻¹) e outono (MAM, com VM = -35,8 mm mês⁻¹) e superestimativa nos meses de inverno (JJA, com VM = +42,5 mm mês⁻¹) e primavera (SON, VM = +21,0 mm mês⁻¹) (Figura 3B). Apesar das simulações do RegCM4 serem mais secas (úmidas) no verão (inverno), há uma compensação anual o que justifica a utilização dos dados simulados do RegCM4 para representar o clima presente (1979-2005) (REBOITA et al., 2018b) e serem utilizadas no cálculo da ETP e do balanço hídrico climatológico para Itajubá.

5.2. Clima Futuro

Com relação ao clima futuro, as projeções do RegCM4 indicam um aumento crescente e gradual de temperatura média do ar em Itajubá (Figura 4A), principalmente no mês de setembro (~6°C). Os aumentos poderão alcançar ~1,8°C no outono (MAM) no FP (2021-2049) e ~5°C no FD (2071-2099) no inverno (JJA) e primavera (SON) (Figura 4B). Além disso, projeta-se uma tendência heterogênea da precipitação

acumulada, sendo que na primavera e no verão (SON, DJF) existe projeção de aumento e no outono e no inverno (MAM, JJA) projeção de diminuição da precipitação acumulada mensal (Figura 4D), resultados que corroboram com Tavares et al. (2018), Reboita et al. (2018b), Santos et al. (2017) e Florêncio et al. (2019). Cabe ressaltar que todos os autores utilizam diferentes modelos para as projeções climáticas e, especialmente, Santos et al., (2017) e Florêncio et al., (2019), utilizam dados de projeções climáticas oriundos de modelos globais e, mesmo assim, estão coerentes com o presente estudo.




Figura 4: Variação temporal simulada (1979-2005) e projetada (2021 – 2099) e padrão mensal da temperatura média do ar (A,B), precipitação acumulada anual/mensal (C,D), evapotranspiração acumulada anual/mensal (E,F) para Itajubá considerando o período atual (1979 – 2005), futuro próximo (2021-2049) e futuro distante (2071-2099) obtidas pelo modelo regional RegCM4 e cenário forçante 8.5. Devido aos valores, os eixos das variáveis estão em escalas diferentes.

Esse padrão heterogêneo de projeção da $\bar{P}_{med}$ associado ao aumento da $\bar{T}_{med}$ (Figura 4A-D) reflete diretamente em mudança mensal (sazonal) e anual da ETP (Figura 4E,F) e alteram a demanda atmosférica (LEMOS FILHO et al., 2010), impactando no BHC (SANTOS et al., 2017). De maneira geral, a projeção da ETP seguirá o mesmo padrão da $\bar{T}_{med}$ e $\bar{P}_{med}$ (Figura 4A,C), sendo intensificada no FD (2071-2099) (Figura 4E). De maneira específica, projeta-se aumento da ETP em todos os meses do ano, porém os meses de março, outubro e janeiro terão os maiores aumentos, com valores superiores a 35 mm mês⁻¹. Em uma análise mais detalhadas percebe-se que, justamente nos meses da primavera (SON), em que há os maiores aumentos projetados de $\bar{T}_{med}$ (~5°C), e verão (DJF) (Figura 4B) haverá os maiores aumentos de ETP (Figura 4F). Isso indica que apesar do aumento de extremos (chuvas acima da média) justamente em SON e DJF (Figura 4D), a demanda evaporativa será maior pelo impacto do aumento da temperatura do ar. Isso reflete diretamente em alterações no extrato do BHC (ETR, DEF e EXC) (Figura 5).




Figura 5: Variação temporal simulada (1979-2005) e projetada (2021 – 2099) para a evapotranspiração real anual (A), excedente hídrico anual (C) e deficiência hídrica anual (E) para o cenário forçante RCP 8.5; e padrão mensal da evapotranspiração real acumulada (B), excedente hídrico (D) e deficiência hídrica (F) para Itajubá (MG), considerando o período atual (1979 – 2005), futuro próximo (2021-2049) e futuro distante (2071-2099) para o cenário forçante 8.5. Devido aos valores, os eixos das variáveis estão em escalas diferentes.

Com relação ao balanço hídrico, percebe-se aumentos nos valores de ETR, seguindo exatamente o padrão esperado, devido a combinação entre o aumento da ETP e $\bar{P}_{med}$, principalmente nos meses da primavera (SON) e verão (DJF) (Figura 5A,B),

chegando a 37 mm mês^{-1} em março no FD (Figura 5B), corroborando com os resultados de Cardoso e Justino (2014).

Já com relação ao excedente hídrico (EXC), haverá padrão heterogêneo de alteração desta variável, convergindo para ligeira redução no final do século XXI (Figura 5C). No entanto, o padrão sazonal de alteração é distinto, com aumento no verão (DJF) e redução no outono (MAM) e primavera (SON) (Figura 5D). No inverno (JJA), o padrão climatológico do EXC no PP, de chuvas abaixo da média ($\sim 60 \text{ mm}$), será intensificado, ou seja, haverá redução da $\bar{P}_{med}$ e consequentemente do EXC nesses meses. Já nos meses SON e DJF é projetado o oposto, com aumento da $\bar{P}_{med}$ e EXC. Esse padrão também foi observado por Santos et al. (2017) e Reboita et al. (2018) para a região sul de Minas Gerais, e ocorre devido ao aumento projetado da $\bar{P}_{med}$ acima da média ($\sim 190 \text{ mm}$) para o verão (Figura 4C,D), elevando os valores de excedente hídrico em Itajubá.

O aumento do EXC no verão pode não ser benéfico. Primeiro, pois indica aumento de episódios de eventos extremos, o que ocasiona maiores volumes de chuva em curto espaço de tempo e, segundo, pois acarreta o aumento da água nociva. Ambas as situações, combinadas com o relevo de Itajubá, constituem em aumento da vazão líquida e sobrecarga do sistema de drenagem, o qual se encontra atualmente subdimensionado não comportando o escoamento. Isso causará enchentes e inundações em cotas superiores a eventos anteriores, além de perdas econômicas para a população residente, principalmente, em zonas de várzea.

Nos meses de abril, maio e junho (Figura 5D), as projeções de EXC no FP e FD são de $\sim 0 \text{ mm}$, indicando redução do volume de água no solo e início de situação de déficit hídrico (DEF) (Figura 5 E,F). Nesse aspecto, projeta-se aumento da DEF justamente nesses meses, além de agosto. Porém, as projeções da DEF ao longo do século, indicam ligeiro aumento da DEF acumulada no final do século XXI, principalmente entre 2080-2090, de aproximadamente 100 mm (Figura 5E), semelhante ao observado por Santos et al. (2017) na região sul e sudeste de MG.

Mesmo com a tendência de pequeno aumento da DEF e redução do EXC, ambas as situações causarão prejuízos no setor agrícola, pois agrava a aridez entre os meses de abril à setembro (principalmente em JJA), que coincidem com o plantio de culturas de verão e com o enchimento de grãos ou formação do fruto nos plantios precoces de culturas de inverno, principalmente realizados entre março-abril. Como exemplo vale

citar a influência dessas situações nas três culturas anuais que apresentam maior representatividade em termos de área plantada em Itajubá no ano de 2018/2019 (SIDRA, 2019): milho (1ª, com área plantada de 60 ha) batata (2ª, com área plantada de 19 ha) e feijão (3ª, com área plantada de 15 ha).

O milho é susceptível à DEF especialmente durante o pendoamento, florescimento, polinização (RAMIREZ-CABRAL et al., 2017) e principalmente durante o enchimento de grãos, no qual a DEF causa perdas de 90% no rendimento (DOORENBOS; KASSAM, 1979; RAMIREZ-CABRAL et al., 2017; RESENDE et al., 2019). Em Itajubá, o enchimento de grãos ocorre entre os meses de janeiro, nos plantios antecipados no decêndio 28: 05/10, a abril, nos plantios tardios no decêndio 36: 25/12 (MAPA, portaria nº55), justamente no período que ocorre aumento da DEF (Figura 5F). Por outro lado, prejuízos também decorrem do aumento do EXC na fase que antecede o pendoamento (RESENDE et al., 2019), que ocorre entre os meses de novembro, nos plantios antecipados no decêndio 28: 05/10, a fevereiro, nos plantios tardios no decêndio 36: 25/12 (MAPA, portaria nº55). Justamente aqueles em que há projeção de aumento da $\bar{P}_{med}$ (Figura 4D) e do EXC (Figura 5D). O excesso de água no solo causa danos às raízes de milho, devido ao acúmulo de bioprodutos tóxicos (RAMIREZ-CABRAL et al., 2017), reduz a fotossíntese, devido ao aumento de dias nublados (RESENDE et al., 2019), reduzindo o acúmulo de biomassa e o rendimento. Ou seja, o milho será duplamente prejudicado nos cenários de mudanças climáticas projetados em Itajubá.

A batata é uma cultura suscetível majoritariamente em condições de temperaturas elevadas e minoritariamente aos padrões irregulares de precipitação, exatamente o padrão projetado para Itajubá (Figura 4A,B,C,D). Em Itajubá cultiva-se preferencialmente entre os meses de agosto a outubro, colhendo a partir de meados de novembro até o final de janeiro, respectivamente. Aumentos projetados de $\bar{T}_{med}$ causarão prejuízos ao cultivo da batata em Itajubá. Isso ocorre devido ao mecanismo de bioconversão das plantas C3, o qual a batata está inserida, sendo que em condições de temperatura elevada ocorre o efeito de Warburg, onde o O₂ inibe a fixação da CO₂ pela rubisco², reduzindo a fotossíntese e elevando a fotorrespiração (MARENCO; LOPES, 2009). Essa combinação reduz a qualidade dos tubérculos (aumento de rachaduras e necroses) e a produtividade (FAGUNDES et al., 2010 a,b). Em cultivos de batata no sul

² RUBISCO = enzima ribulose 1-5 bifosfato carboxilase-oxigenase responsável pelo processo metabólico que governa a fotossíntese (FLORÊNCIO et al., 2019).

de MG, o aumento da temperatura média do ar causa atrasos no início da tuberização e no início do florescimento, redução na partição de fotoassimilados para os tubérculos e redução de 25,5% na produtividade (MENEZES et al., 1999). Além disso, aumento de $\bar{T}_{med}$ na fase de início da tuberização, que ocorre entre os meses setembro nos plantios antecipados em agosto, a novembro nos plantios tardios em outubro, favorecem o crescimento da parte aérea em detrimento dos tubérculos. Isso afeta a quantidade e a qualidade da produção, devido ao atraso da tuberização e à manifestação de defeitos fisiológicos e deformações nos tubérculos, como embonecamento, coração oco, rachaduras e necroses (BISOGNIN; STRECK, 2009; FAGUNDES et al., 2010 a,b). Em geral, cada aumento projetado de 1°C reduz 1% na produtividade da batata (FAGUNDES et al., 2010 a,b).

Concomitante, exigem-se temperaturas amenas e EXC moderado na fase de maturação dos tubérculos, que ocorre de novembro (plantios em agosto) a janeiro (plantios em outubro). Padrões diferentes deste, como o projetado em Itajubá, aceleram o processo de maturação das plantas de batata. Quanto mais curto for o estágio de maturação das plantas menores são as quantidades de assimilados translocados para os tubérculos e, em consequência, menor é o teor final de matéria seca. (Figuras 4B, 5D) (BISOGNIN; STRECK, 2009; ZANON et al., 2013).

Para a cultura do feijão, resumidamente, é sensível tanto a presença quanto ausência de precipitação, uma vez que ambas afetam a disponibilidade hídrica do solo, o que influencia a absorção de água e nutrientes pelas raízes (HEINEMANN et al., 2009). Em períodos de estiagem, as principais respostas são a redução da área foliar, modificações no sistema radicular, redução da condutância e fechamento estomático, fatores determinantes na redução da assimilação do carbono e, consequentemente, levam à diminuição da fotossíntese e produtividade, além do atraso na maturação do feijão (DARKWA et al., 2016; MATHOBO et al., 2017).

As safras de feijão mais impactadas em Itajubá serão a 2ª e 3ª, com data média de plantio em 25/jan e 05/jul, respectivamente (SANTOS et al., 2018). A 2ª safra será impactada durante o florescimento, que vai do início de março a abril, enquanto a 3ª será impactada na germinação, florescimento (pré-floração e floração) e frutificação (formação e enchimento das vagens). A DEF durante o florescimento, que vai de julho a agosto, provoca o aborto e a queda das flores, reduzindo o número de vagens por planta e o rendimento médio (HEINEMANN et al., 2016; HEINEMANN et al., 2017; SANTOS et al., 2018). A DEF durante a frutificação, que vai de agosto a setembro,

induz a queda das vagens recém-formadas, prejudica a formação de sementes nas vagens, diminui a massa e o rendimento (OLIVEIRA et al., 2018). Além disso, o plantio da 3ª safra ocorre justamente nos meses de julho e agosto sendo necessárias chuvas para que ocorra a germinação uniforme das sementes (SANTOS et al., 2018). Entretanto, chuvas excessivas reduzem a oxigenação do solo e a atividade radicular, afetando a absorção de água e nutrientes pelo feijoeiro (HEINEMANN et al., 2009).

Adicionalmente, Itajubá produz o equivalente a R\$ 1.326.000 em produtos de culturas permanentes e temporárias, sendo o café a cultura mais significativa para o município, representando 21,19% do valor total da produção (IBGE, 2017). Nesse sentido, o aumento projetado de temperatura (≥ 25 °C em janeiro) (Figura 4B) é o que mais impactará o café (TAVARES et al., 2018), pois exige-se temperaturas médias entre 18 e 22,5 °C e DEF < 150 mm. Tal aumento prejudicará a frutificação, resultando em baixa produtividade (SEDIYAMA et al., 2001). O café possui um ciclo fenológico de dois anos, sendo, portanto, mais susceptível aos efeitos das variações climáticas em qualquer uma de suas seis fases de desenvolvimento (CAMARGO, 2001). Na florada, que ocorre entre a primavera e verão do segundo ano, há um aumento do potencial hídrico nas gemas florais maduras. Quando há excesso de água recebida nessa fase, como projetado para os meses primavera e verão (Figura 4D), ocorre o fenômeno de floração indefinida, o que atrasa a fase de granação dos frutos. Além disso, temperaturas elevadas, durante o início da florada, como projetado para o final do século XXI (Figura 4B), provoca a morte do tubo polínico pela desidratação, causando o abortamento das flores (CAMARGO, 2001). Essas mudanças devem reduzir a qualidade do café e as áreas de aptidão ao cultivo do mesmo na região sul de Minas Gerais (~25%), conforme observado por Tavares et al. (2018), além do deslocamento do cultivo somente para locais de maior altitude. Esse cenário dificultará o plantio e a realização dos tratamentos culturais devido a movimentação do maquinário e a falta de adaptabilidade dos produtores que em sua maioria se classificam como agricultura familiar (TAVARES et al., 2018).

Devido ao impacto significativo nas principais culturas anuais e perenes cultivadas em Itajubá, algumas estratégias deverão ser adotadas para minimizar os impactos. As principais estratégias para a redução dos impactos negativos são: a escolha e a seleção de espécies, cultivares e variedades mais tolerantes, atualização constante dos mapas de aptidão climática e zoneamento agrícola, alteração dos locais de cultivo,

modificações das épocas mais recomendadas ao plantio e alteração das práticas de manejo.

Além do setor agrícola, o setor energético também sofrerá com os impactos projetados em Itajubá. Como se sabe, o município possui duas pequenas centrais hidrelétricas (PCH) instaladas e em funcionamento (PCH Luiz Dias e PCH São Bernardo), além de diversas centrais geradoras hidrelétricas (CGH), gerando um total de 8,4 MW, e com a diminuição da $\bar{P}_{med}$ projetada entre os meses março e setembro, a geração de energia hidrelétrica poderá sofrer com a diminuição do volume útil disponível, sendo necessária a compensação desse déficit de geração de energia através da utilização de combustíveis fósseis, favorecendo ainda mais a aceleração das mudanças climáticas. Além disso, essa diminuição no volume de $\bar{P}_{med}$ prejudicará a recarga de águas subterrâneas que recarregam os rios e mananciais em períodos de estiagem, causando problemas no abastecimento público e na falta de água para a irrigação que será cada vez mais necessária devido ao aumento do déficit hídrico no solo.

6. CONCLUSÃO

A combinação entre os padrões irregulares de precipitação, com aumento nos meses de primavera/verão e redução nos meses de outono/inverno, e aumento de $\sim 5^\circ\text{C}$ na temperatura, impactarão as principais culturas anuais e perenes cultivadas em Itajubá, alterando a fenologia do desenvolvimento e as áreas destinadas ao plantio. A deficiência hídrica será intensificada, principalmente nos meses mais secos do ano (JJA), enquanto o excedente hídrico será intensificado nos meses mais chuvosos (DJF). Para os usuários de recursos hídricos, haverá prejuízos ambientais e econômico, pois com o aumento da vazão líquida, o sistema de drenagem, atualmente subdimensionado, não comportará o escoamento, causando enchentes e inundações em cotas superiores a eventos anteriores, causando perdas econômicas para a população residente em zonas de várzea, além de possíveis deslizamentos devido a saturação do solo nas encostas. Na questão ambiental, o aumento da produção de água nociva pode destruir áreas de reprodução de peixes e anfíbios, acarretando em alterações no ecossistema, como a proliferação de vetores, além de aumentar a necessidade de investimento em projetos de recuperação ambiental, que podem ocasionar indiretamente no aumento das tarifas de outorga de recursos hídricos para os usuários.

Já para os produtores rurais, o aumento do excedente hídrico nos meses de DJF prejudicará o retorno financeiro acarretando quebra de produtividade, principalmente nas culturas de verão, como a batata, feijão, milho, assim como a oliveira, as quais são cultivadas na região de Itajubá. Isso ocorre pois o aumento do volume de chuva satura o solo, reduz a transpiração e consequentemente a entrada de CO_2 para a realização da fotossíntese, diminuindo a produção de fotoassimilados. Por outro lado, causa prejuízos no crescimento radicular e na formação de tubérculos, acarretando em tubérculos de menor tamanho ou insuficientes para a comercialização.

Apesar da efetividade em demonstrar os impactos projetados para o século XXI, os resultados obtidos através dessa pesquisa carecem de uma análise comparativa com projeções climáticas que utilizam outros cenários de emissões, como o RCP6, RCP4.5 e RCP2.6. Adicionalmente, uma análise utilizando outros modelos de projeções climáticas e diferentes condições de contorno contribuiriam para a representatividade dos resultados obtidos para o clima futuro.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMBRIZZI, T.; REBOITA, M. S.; DA ROCHA, R. P.; LLOPART, M. The state-of-the-art and fundamental aspects of Regional Climate Modeling in South America. **Annals of the New York Academy of Sciences, especial edition: Climate Science**, p. 1-23, 2018.
- ASSAD, E. D.; MARTINS, S. C.; BELTRÃO, N. E. M.; PINTO, H. S. Impacts of climate change on the agricultural zoning of climate risk for cotton cultivation in Brazil. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 48, n. 1, p. 1-8, 2013.
- ASSAD, E. D.; PINTO, H. S.; ZULLO JUNIOR, J.; ÁVILA, A. M. H. Impacto das mudanças climáticas no zoneamento agroclimático do café no Brasil. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 39, n. 11, p. 1057-1064, 2004
- BARBOSA, A. A.; OLIVEIRA, G. M.; OLIVEIRA, T. J. Histórico de enchentes em Itajubá/MG. **Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade**, v. 9, n. 4, p. 125-140, 2015.
- BISOGNIN, D. A.; STRECK, N. A. **Desenvolvimento e manejo das plantas para alta produtividade e qualidade da batata**. Itapetininga: Associação Brasileira da Batata. 2009, 30 p. Disponível em: <<http://w3.ufsm.br/fitotecnica/images/Batata.pdf>> Acesso em: 21 de junho de 2019.
- CAMARGO, A. P.; CAMARGO, M. B. P. Definição e esquematização das fases fenológicas do cafeeiro arábica nas condições tropicais do Brasil. **Bragantia**, v. 60, n. 1, p. 65-68, 2001.
- CARDOSO, G. M.; JUSTINO, F. Simulação dos componentes da evapotranspiração sob condições climáticas atuais e de cenários climáticos futuros de aquecimento global com o uso de modelos de clima-vegetação. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v.29, p.85-95, 2014.
- CARVALHO, H. P.; NETO, D. D; TEODORO, R. E. F.; MELO, B. Balanço Hídrico Climatológico, Armazenamento Efetivo Da Água No Solo E Transpiração Na Cultura De Café. **Bioscience Journal**, v.27, n.2, p. 221-229, 2011.
- CERA, J. C.; FERRAZ, S. E. T. Variações climáticas na precipitação no sul do Brasil no clima presente e futuro. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 30, n. 1, p. 81-88, 2015.
- CHEN, M.; SHI, W.; XIE, P.; SILVA, V.B.S.; KOUSKY, V.E.; WAYNE HIGGINS, R.; JANOWIAK, J.E. Assessing objective techniques for gauge-based analyses of global daily precipitation. **Journal of Geophysical Research**, v. 113, n.4, p. 1-13, 2008.
- CUADRA, S. V.; ROCHA, R. P. da. Simulação numérica do clima de verão sobre o Brasil e sua variabilidade. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 21, n. 2, p. 271-282, 2006.
- DARKWA, K.; AMBACHEW, D.; MOHAMMED, H.; ASFAW, A.; BLAIR, M. W. Evaluation of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) genotypes for drought stress adaptation in Ethiopia. **The crop Journal**, v. 4, n. 5, p. 367-376, 2016.

DARELA-FILHO, J.; LAPOLA, D.; RODRIGUES TORRES, R.; LEMOS, M. Socio-climatic hotspots in Brazil: how do changes driven by the new set of IPCC climatic projections affect their relevance for policy? **Climatic Change**, v. 136, n. 4, p. 24-34, 2016.

DOORENBOS, J.; KASSAM, A.H. Yield response to water. **Rome: FAO. Irrigation and Drainage Paper**, v. 33, 193p, 1979.

FAGUNDES, J. D.; De PAULA, G. M.; LAGO, I.; STRECK, N. A.; BISOGNIN, D. A. Aquecimento global: efeitos no crescimento, no desenvolvimento e na produtividade da batata. **Ciência Rural**, v. 40, p. 1464-1472, 2010a.

FAGUNDES, J.D.; STRECK, N.A.; BISOGNIN, D.A.; SCHWANTES, A.P.; ALBERTO, C.M. Produtividade simulada de tubérculos de batata em cenários de mudanças climáticas. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.45, n.4, p. 351-360, 2010b.

FLORÊNCIO, G.W.L.; MARTINS, F.B.; FERREIRA, M.C.; PEREIRA, R.A.A. Impacts of climatic change on the vegetative development of olive cultivars. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 23, n.9, p.77-82, 2019.

GIORGI, F.; JONES, C.; ASRAR, G. R. Addressing climate information needs at the regional level: the CORDEX framework. **World Meteorological Organization Bulletin**, v. 58, p. 175–183, 2009.

HEINEMANN, A. B.; STONE, L. F.; SILVA, S. C. Feijão. Em: MONTEIRO, J. E. **In: Agrometeorologia dos cultivos: o fator meteorológico na produção agrícola**. INMET, Brasília, p. 182-201, 2009.

HEINEMANN, A.B.; RAMIREZ-VILLEGAS, J.; SOUZA, T.L.P.O.; DIDONET, A.D.; DI STEFANO, J.G.; BOOTE, K.J.; JARVIS, A. Drought impact on rainfed common bean production areas in Brazil. **Agricultural and Forest Meteorology**, v. 225, p.57-74, 2016.

HEINEMANN, A.B.; RAMIREZ-VILLEGAS, J.; STONE, L.F.; DIDONET, A.D. Climate change determined drought stress profiles in rainfed common bean production systems in Brazil. **Agricultural and Forest Meteorology**, v. 246, p. 64-77, 2017.

IBGE – Instituto Brasileira de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro. 2019. Disponível em <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/itajuba>>. Acesso em: 26 de setembro de 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística. Pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil. Levantamento sistemático da produção agrícola, Rio de Janeiro, v. 30, n.6, p.1-83, 2017.

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change - Summary for Policymaker. In: STOCKER, T. F.; QIN, D.; PLATTNER, G. K.; TIGNOR, M.; ALLEN, S. K.; BOSCHUNG, J.; NAUELS, A.; XIA, Y.; BEX, V.; MIDGLEY, P. M. (Eds). **Climate Change 2013: The Physical Science Basis**. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2013.

IPEA. A década inclusiva (2001-2011): desigualdade, pobreza e políticas de renda. Rio de Janeiro: IPEA, 2012. (Comunicado do Ipea, n. 155).

IP SUSTENTABILIDADE. **Fossa ecológica TEvap**, 2019. Disponível em: <<http://ipsustentabilidade.com/urbana/tevap/>>. Acesso em: 05 abr. 2019.

- LEMOS FILHO, L. C. A.; CARVALHO, L. G.; EVANGELISTA, A. W. P.; ALVES JÚNIOR, J. Análise espacial da influência dos elementos meteorológicos sobre a evapotranspiração de referência em Minas Gerais. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 14, n.12, p. 1294-1303, 2010.
- LLOPART, M.; ROCHA, R. P. da.; REBOITA, M. S.; CUADRA, S. Sensitivity of simulated South America climate to the land surface schemes in RegCM4. **Climate Dynamics**, v. 49, n.11, p. 3975-3987, 2017.
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria 55/2019. Brasília. 2019. Disponível em <<http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-55-de-1-de-julho-de-2019-191918853>>. Acesso em: 26 de setembro de 2019.
- MARENCO, R.A.; LOPES, N.F. Fisiologia vegetal: fotossíntese, respiração, relações hídricas e nutrição mineral. **Universidade Federal de Viçosa**, 2009. 436p
- MARTINS, F. B.; GONZAGA, G.; SANTOS, D. F.; REBOITA, M. S. Classificação Climática De Köppen E De Thornthwaite Para Minas Gerais: Cenário Atual e Projeções Futuras. **Revista Brasileira de Climatologia**, v.14, p. 129-156, 2018.
- MARTINS, F. B.; PEREIRA, R. A. A.; PINHEIRO, M. V.; ABREU, M. C. Desenvolvimento foliar em duas cultivares de oliveira estimado por duas categorias de modelos. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v.29, n.4, p. 505 - 514, 2014.
- MARTINS, M. A.; TOMASSELLA, J.; DIAS, C. G. Maize yield under a changing climate in the Brazilian Northeast: Impacts and adaptation. **Agricultural Water Management**, v.216, p.339-350, 2019.
- MATHOBO, R.; MARAIS, D.; STEYN, J. M. The effect of drought stress on yield, leaf gaseous exchange and chlorophyll fluorescence of dry beans (*Phaseolus vulgaris* L.). **Agricultural Water Management**, v. 180, p. 118-125, 2017.
- MENEZES, C.B. PINTO, C.A.B.P.; NURMBERG, P.L.; LAMBERT, E.S. Avaliação de genótipos de batata (*Solanum tuberosum* L.) nas safras das águas e inverno no sul de Minas Gerais. **Ciência e Agrotecnologia**, v.23, n.4, p. 776-783, 1999.
- MOSS, R. H.; EDMONDS, J. A.; HIBBARD, K. A.; MANNING, M. R.; ROSE, S. K.; VAN VUUREN, D. P.; CARTER, T. R.; EMORI, S.; KAINUMA, M.; KRAM, T.; MEEHL, G. A.; Mitchell, J. F. B.; NAKICENOVIC, N.; RIAHI, K.; SMITH, S. J.; STOUFFER, R. J.; THOMSON, A.; WEYANT, J. P.; WILLBANKS, T. J. The next generation of scenarios for climate change research and assessment. **Nature**, v.463, p.747-756, 2010.
- NATIVIDADE, U. A.; GARCIA, S. R.; TORRES, R. R. Tendência dos Índices de Extremos Climáticos Observados e Projetados no Estado de Minas Gerais. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 32, p. 600-614, 2017.
- OLIVEIRA, M.G.C.; OLIVEIRA, L.F.C.; WENDLAND, A.; GUIMARÃES, C. M.; QUINTELA, E. D.; BARBOSA, F. R.; CARVALHO, M. da C. S.; LOBO JUNIOR, M.; SILVEIRA, P. M. da. Conhecendo a fenologia do feijoeiro e seus aspectos fitotécnicos. **EMBRAPA**: Brasília, 2018. 62p.
- PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. **Meteorologia Agrícola**. Piracicaba, 2007. 192p.
- PEREIRA, A. R. Simplificando O Balanço Hídrico de Thornthwaite. **Bragantia**, v.64, n.2, p.311-313, 2005.

- PORFIRIO, L. L.; NEWTH, D.; FINNIGAN, J. J.; CAI, Y. Economic shifts in agricultural production and trade due to climate change. **Palgrave Communications**, v.4, p. 111-125, 2018.
- RAMIREZ-CABRAL, N. Y. Z.; KUMAR, L.; SHABANI, F. Global alterations in areas of suitability for maize production from climate change and using a mechanistic species distribution model (CLIMEX). **Scientific Reports**, v.7, p. 1-13, 2017.
- REBOITA, M. S.; MARRAFON, V. H. A.; LLOPART, M.; DA ROCHA, R. P. Cenários de mudanças climáticas projetadas para o estado de Minas Gerais. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 33, n. 2, p. 207-224, 2018a.
- REBOITA, M. S.; DIAS, C. G.; DUTRA, L. M.; DA ROCHA, R. P.; LLOPART, M. Previsão climática sazonal para o Brasil obtida através de modelos climáticos globais e regional. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 33, n. 2, p. 207-224, 2018b.
- RESENDE, N. C.; MIRANDA, J. H.; COOKE, R.; CHU, M. L.; CHOU, S. C. Impacts of regional climate change on the runoff and root water uptake in corn crops in Parana, Brazil. **Agricultural Water Management**, v.221, p. 556-565, 2019.
- SANTOS, D. F. dos; MARTINS, F.B.; TORRES, R.R. Impacts of climate projections on water balance and implications on olive crop in Minas Gerais. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 21, n. 2, p. 77 – 82, 2017.
- SANTOS, L. F.; MARTINS, F. B.; GARCIA, S. R. Padrões climatológicos de precipitação e temperatura do ar associados ao rendimento do feijão comum em Minas Gerais. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 14, p.3-24, 2018.
- SEDIYAMA, G.C.; MELO JUNIOR, J.C.; SANTOS, A.R.; RIBEIRO, A.; COSTA, M.H.; HAMAKAWA, P.J.; COSTA, J.M.N.; COSTA, L.C. Zoneamento agroclimático do cafeeiro (*Coffea arabica* L.) para o Estado de Minas Gerais. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v.9, p.501-509, 2001.
- SENTELHAS, P.C.; SANTOS, D.L. dos; MACHADO, R.E. Water deficit and water surplus maps for Brazil, based on FAO Penman-Monteith potential evapotranspiration. **Revista Ambiente e Água**, v. 3, p. 28-42, 2008.
- SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática. Rio de Janeiro. 2019. Disponível em: <(https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/1612#resultado)> Acesso em: 24 de setembro de 2019.
- SILVA, E. D.; REBOITA, M. S. Estudo da Precipitação no Estado de Minas Gerais – MG. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 13, p. 120-136, 2013.
- SLAMA, F.; ZEMNI, N.; BOUKSILA, F. Modelling the Impact on Root Water Uptake and Solute Return Flow of Different Drip Irrigation Regimes with Brackish Water. **Water**, v. 11, p. 1-17, 2019.
- TANASIJEVIC, L.; TODOROVIC, M.; PEREIRA, L. S.; PIZZIGALLI, C.; LIONELLO, P. Impacts of climate change on live crop evapotranspiration and irrigation requirements in the Mediterranean region. **Agricultural Water Management**, v.144, p. 54-68, 2014.
- TAVARES, P. S.; GIAROLLA, A.; SILVA, A. J. P.; LYRA, A. A.; CHOU, S. C. Climate change impact on the potential yield of Arabica coffee in southeast Brazil. **Regional Environmental Change**, v.18, p. 873-883, 2018.

THORNTHWAITE, C.W.; WILM, H.G. Report of the Committee on evapotranspiration and transpiration, 1943-1944. Washington, D.C.: **Transactions of the American Geophysical Union**, p.686-693, 1944.

THORNTHWAITE, C.W. An approach toward a rational classification of climate. **Geographical Review**, New York, v.38, n.1, p.55-94, 1948.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and water balance. **Centerton: Drexel Institute of Technology - Laboratory of Climatology**, 1957. 311p.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. **The Water Balance**. Centerton, N.J.: Drexel Institute of Technology - Laboratory of Climatology, 104p. 1955. Publications in Climatology, v.8, n.1.

TORRES, R. R.; MARENGO, J. A. Climate change hotspots over South America: from CMIP3 to CMIP5 multi-model datasets. **Theoretical and Applied Climatology**, v. 117, n. 3, p. 579-587, 2014.

TORRES, R. R.; LAPOLA, D. M.; MARENGO, J. A.; LOMBARDO, M. A. Socio-climatic hotspots in Brazil. **Climatic Change**, v. 115, n. 3-4, p. 597-609, 2012.

WOLDEMESKEL, F. M.; SHARMA, A.; SIVAKUMAR, B.; MEHROTRA, R. Quantification of precipitation and temperature uncertainties simulated by CMIP3 and CMIP5 models. **Journal of Geophysical Research Atmospheres**, v. 120, p. 1-15. 2016.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. Calculation of monthly and annual 30-year standard normals. Geneva, 1989. Technical document, n. 341; WCDP, n. 10

ZANON, A. L.; STRECK, N. A.; DA SILVA, M. R.; BISOGNIN, D. A. Desenvolvimento das plantas e produtividade de tubérculos de batata em clima subtropical. **Revista Ciência Agronômica**, v. 44, n. 4, p. 858-868, 2013.